

## INSTRUCCIONES PARA TRATAMIENTO CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)



### ANTES DEL TRATAMIENTO

- Se recomienda que dos semanas antes del tratamiento, para minimizar el riesgo de hematomas o sangrado, evite tomar aspirina, ibuprofeno, Advil, Motrin, Aleve, vitamina E, Omega 3, suplementos de cúrcuma y suplementos de Ginkgo biloba. Tylenol está bien.
- Suspenda el uso de todos los productos que contengan retinol, ácido glicólico, alfa o beta hidroxiácidos durante al menos una semana antes del tratamiento.

### DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

- Durante las 24 horas posteriores al tratamiento, evite tocar las zonas que fueron tratadas.
- Mantenga la piel hidratada y use bloqueador solar con SPF 50. Retoque el mismo cada dos horas para una mejor protección.
- Evite la exposición al calor directo durante 24 horas después del tratamiento. Algunos ejemplos de calor directo incluyen: secador de cabello, exposición al sol, uso de sauna, uso de vapor, ducha muy caliente y ejercicio intenso.
- No debe recibir otros tratamientos faciales, masajes faciales o tratamientos con láser durante 2 semanas.
- Después del tratamiento con PRP, los efectos secundarios temporales más frecuentes son hinchazón, enrojecimiento, hematomas y sensación de presión en el área tratada.

Queremos que tengas un resultado excelente. Si tiene alguna pregunta o inquietud inesperada, llame a la oficina para obtener ayuda 787-832-4422 Mayagüez / 787-986-7646 Yauco.

---

FIRMA

---

FECHA

### **\*\*NOTA ACLARATORIA\*\***

No garantizamos que el resultado final sea el esperado y los resultados pueden variar por paciente. No se devuelve dinero ni se hace crédito a tarjetas, todo reembolso será expedido en crédito a utilizar en algún otro servicio que ofrezcamos.