

INSTRUCCIONES PARA TRATAMIENTO CON RELLENOS DÉRMICOS



ANTES DEL TRATAMIENTO:

- Se recomienda que dos semanas antes del tratamiento, para minimizar el riesgo de hematomas o sangrado, evite tomar aspirina, ibuprofeno, Advil, Motrin, Aleve, vitamina E, Omega 3, suplementos de cúrcuma y suplementos de Ginkgo biloba. Tylenol está bien.
- Suspenda el uso de todos los productos que contengan retinol, ácido glicólico, alfa o beta hidroxiácidos durante al menos una semana antes del tratamiento.
- Evite el uso de aspirina, Ginkgo Biloba, suplementos de ajo, té verde, aceite de lino, aceite de hígado de bacalao hasta 1 semana antes y después de la inyección, ya que pueden aumentar el riesgo de hematomas.
- No ingiera bebidas alcohólicas 24 horas antes de su tratamiento para evitar hematomas.
- Puede tomar tabletas de Arnica 2 a 3 días antes de su inyección para reducir el riesgo de hematomas.
- No debe aplicar productos que sean potencialmente irritantes durante 2 -3 días antes y después del tratamiento (ejemplos: tretinoína/retin-a, ácido glicólico, peróxido de benzoilo, hidroquinona)
- Informe a su proveedor si tiene antecedentes de herpes labial para recibir asesoramiento sobre la terapia antiviral antes del tratamiento.
- De ser posible, no use maquillaje antes de llegar a su cita.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO:

- Tenga en cuenta que el enrojecimiento y la hinchazón son normales. Algunos moretones también pueden ser visibles.
- Puede usar compresas frías (pero evite la presión firme) durante 15 minutos hasta 3 veces el día del tratamiento
- Puede tomar acetaminofeno (Tylenol) si experimenta alguna molestia o sensibilidad leve.
- Evite el ejercicio extenuante durante 24 horas para reducir los moretones. Puede reanudar otras actividades/rutinas normales de inmediato.

****NOTA ACLARATORIA****

No garantizamos que el resultado final sea el esperado y los resultados pueden variar por paciente. No se devuelve dinero ni se hace crédito a tarjetas, todo reembolso será expedido en crédito a utilizar en algún otro servicio que ofrezcamos.

- Evite el láser, la IPL, el estiramiento de la piel o las inyecciones de relleno cerca del área tratada durante al menos 4 semanas.
- Puede continuar con sus productos tópicos como se mencionó 1 semana después de la inyección. Mientras tanto utilice sólo crema hidratante o reparadora y bloqueador solar.

Queremos que tengas un resultado excelente. Si tiene alguna pregunta o inquietud inesperada, llame a la oficina para obtener ayuda 787-832-4422 Mayagüez / 787-986-7646 Yauco.

FIRMA

FECHA

****NOTA ACLARATORIA****

No garantizamos que el resultado final sea el esperado y los resultados pueden variar por paciente. No se devuelve dinero ni se hace crédito a tarjetas, todo reembolso será expedido en crédito a utilizar en algún otro servicio que ofrezcamos.